

## Pruebas para detectar el cáncer a tiempo

El screening o detección temprana de cáncer implica el uso de pruebas y procedimientos para identificar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas. Los tipos de screening varían según el tipo de cáncer y los factores de riesgo del paciente.<sup>1</sup>

**Conocé qué tipos de pruebas debes solicitar a tu médico de acuerdo con tu género y edad.**

En mujeres		
Edades 25-49	Edades 50-69	Edades 69+
<p><b>Pruebas para la detección del cáncer cervical<sup>7,8</sup>:</b></p> <p>A partir de los 25 años. Es importante que las mujeres, incluso tras la menopausia, continúen haciéndose los exámenes de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papanicolaou (Pap)</li> <li>• Test de VPH</li> </ul>	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer cervical<sup>7,8</sup>:</b></p> <p>A partir de los 25 años. Es importante que las mujeres, incluso tras la menopausia, continúen haciéndose los exámenes de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papanicolaou (Pap)</li> <li>• Test de VPH</li> </ul>	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer cervical<sup>7,8</sup>:</b></p> <p>A partir de los 25 años. Es importante que las mujeres, incluso tras la menopausia, continúen haciéndose los exámenes de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papanicolaou (Pap)</li> <li>• Test de VPH</li> </ul>
	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer de mama<sup>5,6</sup></b></p> <p>De los 50 a los 69 años (o antes si existe alto riesgo).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mamografía, RM</li> <li>• Examen clínico de mama</li> <li>• Autoexamen de mama</li> </ul>	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer de mama<sup>5,6</sup></b></p> <p>De los 50 a los 69 años (o antes si existe alto riesgo).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mamografía, RM</li> <li>• Examen clínico de mama</li> <li>• Autoexamen de mama</li> </ul>
	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer colorrectal<sup>9,10</sup>:</b></p> <p>A partir de los 50 a los 75 años (o antes en casos de riesgo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test de sangre oculta en heces</li> <li>• Prueba de ADN en la materia fecal</li> <li>• Colonoscopia y Sigmoidoscopia</li> </ul>	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer colorrectal<sup>9,10</sup>:</b></p> <p>A partir de los 50 a los 75 años (o antes en casos de riesgo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test de sangre oculta en heces</li> <li>• Prueba de ADN en la materia fecal</li> <li>• Colonoscopia y Sigmoidoscopia</li> </ul>
	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer de pulmón<sup>11,12</sup>:</b></p> <p>De 55 a 74 años en fumadores o exfumadores de alto riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TAC de baja dosis</li> </ul>	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer de pulmón<sup>11,12</sup>:</b></p> <p>De 55 a 74 años en fumadores o exfumadores de alto riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TAC de baja dosis</li> </ul>

En hombres	
Edades 50-69	Edades 69+
<p><b>Pruebas para la detección del cáncer colorrectal<sup>9,10</sup>:</b></p> <p>A partir de los 50 a los 75 años (o antes en casos de riesgo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test de sangre oculta en heces</li> <li>• Prueba de ADN en la materia fecal</li> <li>• Colonoscopia y Sigmoidoscopia</li> </ul>	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer colorrectal<sup>9,10</sup>:</b></p> <p>A partir de los 50 a los 75 años (o antes en casos de riesgo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test de sangre oculta en heces</li> <li>• Prueba de ADN en la materia fecal</li> <li>• Colonoscopia y Sigmoidoscopia</li> </ul>
<p><b>Pruebas para la detección del Cáncer de próstata<sup>13,14</sup>:</b></p> <p>De los 50 a los 69 años (o desde los 45 si hay antecedentes).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antígeno prostático específico (PSA)</li> <li>• Tacto rectal</li> </ul>	<p><b>Pruebas para la detección del Cáncer de próstata<sup>13,14</sup>:</b></p> <p>De los 50 a los 69 años (o desde los 45 si hay antecedentes).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antígeno prostático específico (PSA)</li> <li>• Tacto rectal</li> </ul>
<p><b>Pruebas para la detección del cáncer de pulmón<sup>11,12</sup>:</b></p> <p>De 55 a 74 años en fumadores o exfumadores de alto riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TAC de baja dosis</li> </ul>	<p><b>Pruebas para la detección del cáncer de pulmón<sup>11,12</sup>:</b></p> <p>De 55 a 74 años en fumadores o exfumadores de alto riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TAC de baja dosis</li> </ul>



\* Las edades indicadas pueden variar según los antecedentes familiares, factores de riesgo individuales o condiciones de salud específicas.

\* En casos de alto riesgo (por ejemplo, antecedentes familiares o exposición a factores cancerígenos), el médico puede recomendar comenzar el screening a edades más tempranas.

### ¿Tiene preguntas sobre las pruebas de detección?

Visita [www.elfuturoquequeremosver.com.ar](http://www.elfuturoquequeremosver.com.ar) para informarte sobre las pruebas de detección recomendadas según tu género, edad y factores de riesgo. Además, encontrá datos sobre quienes buscan esta información, el cáncer y sus distintos tipos.

#### Referencias

1. National cancer institute (.Gov) [Internet]. Cancer.gov. 2010 [citado el 9 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/about-cancer/screening/patient-screening-overview-pdq>

2. Ovarian, Fallopian tube, & primary peritoneal cancers screening [Internet]. Cancer.gov. 2023 [citado el 10 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/types/ovarian/patient/ovarian-screening-pdq>